


¿Qué países Ind-americanos corresponden a la  
creencia del río de la Plata? Descripción del mismo de  
ellos.

Toluca, Septiembre 4 de 1899.

M. T. Acuña

Enrique E. Schuk González B





¿Que países sud-americanos corres-  
ponden a la cuenca del Rio  
de la Plata? Descripción del  
menor de ellos:

El Rio de la Plata uno  
de los mayores de la Amé-  
rica del Sur corresponde  
a la vertiente del Atlán-  
tico, al Norte se separa su  
cuenca de la del Amazonas  
por la continuación <sup>que</sup> de las  
sierras de Cochabamba y Sta. Bowe  
(Bolivia) y después de los llanos  
Paraxís ~~se~~ <sup>se</sup> ~~extiende~~ <sup>extiende</sup> ~~hacia~~ <sup>hacia</sup> ~~el~~ <sup>el</sup>  
Brasil. Los países que hidro-  
gráficamente pertenecen  
son: Bolivia por el Pilcomayo  
que naciendo en la meseta de  
Potosí ~~se~~ <sup>se</sup> ~~tributa~~ <sup>tributa</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> Rio Paraguay,  
el citado Pilcomayo es el prin-  
cipal habiendo sus afluentes  
y otros ~~menores~~.

Universidad Autónoma del Estado de México  
2009-2013

Paraguay contribuye al gran  
caudal del Plata con los Rios  
Paraguay que lo recorre hacia su  
parte media; el Paraná que se  
une con el anterior hacia el  
Suroeste; en el Norte y en la fron-  
tera con el Brasil el R. Blanco  
tributario del Paraguay.

(2)

Brasil; por Rios Paraguay  
que como ya se indicó nace  
en Sna Paraxís; el Uruguay



que tiene origen en la Sierrita del  
mar con Brasil.

Uruguay se corresponde  
por pequeños ríos la-  
fluentes de las grandes  
arterias ya descritas.

Como se veía este último país  
es el más pequeño y por lo  
tanto el que tratamos de des-  
cribir brevemente; se localiza  
entre el Brasil, el R Uruguay  
que lo separa de la Argentina,  
el R Plata y el Océano Atlántico.

Su superficie es como de  
170,000 km<sup>2</sup> y su población de  
unos 800,000. En su costa  
son los puertos de: Maldonado,  
Montevideo y Colonia.

Un mapa geográfico continua-  
ción de Brasil del mar (en  
Brasil) establece las dos  
vertientes: afluen-  
tes del Uruguay y del Plata y  
al E ríos al Atlántico como son  
el R Yí, el Negro etc.

En capital el Montevideo que  
tiene cerca de 300,000<sup>h</sup>, sobre  
el estuario del Plata.

República central dividida  
en 19 departamentos

Religion oficial es la  
católica, A. Romana,  
blanca templada.

Descripción de un ave.

Dimensiones.

Pico.  $0.02$ . De la base del pico al nacimiento de la cola  $0.10$ .

Cola.  $0.11$ . Tarsos.  $0.025$ .

Pedo medio  $0.02$

Torenas. Pies mas cortos que la cabeza, mas altos que anchos, fuerte comprimido lateralmente y agudos, mandibula las iguales. Aberturas nasales, colocadas un poco arriba y cerca del nacimiento de la mandibula superior, en las aberturas nasales lineales y en birtas en parte por la apertura convexa

Ojos laterales grandes redondos de iris negro, membranas de pluma descompuesta.

Cuello mediano, corto cilindrico cuerpo mediano y esbelto

Pecho y miembro convexos, Dorso casi plano

Alas medianas-sub-oblusas.  $3^{\circ}$  y  $4^{\circ}$  remeras las mas largas, Prima emplumada, prolongandose un poco mas de la articulacion del tarso Tarsos mas largos que el dedo medio, robustos y terminados por 4 dedos insertados a la consona altura, de los cuales tres estan dirigidos hacia ~~atras~~ y adelante y uno hacia atras, son libres, desiguales y es carnosos y terminados por unas delgadas encurvadas y terminadas en punta

(4)

## Coloración.

Parte superior de la cabeza <sup>y cuello</sup> parte inferior del dorso y vientre color amarillo naranjado, parte inferior del cuello, parte superior del dorso alas y cola ~~negro~~ color negro, volanderas en las alas más prominentes blancas.


## Clasificación

Clase de las aves

Orden de los fringíles

Sub-orden - *Troglodytidae*

Fam.



Universidad Autónoma del Estado de México

2009-2013

(3)

Description de un vegetal.

Raiz ?

Tallo aereo ascendente acaulis ramoso cuadrangular pubescente fistuloso y sublenoso.

Hojas apicadas e f  $\frac{1}{4}$  simples completas peciolo corto plano pubescente y herbaceo limbo cordiforme pinnatisubado y abrenado por sus bordes pubescente por ambas caras y herbaceo

Inflorescencia indefinida tipo racimo

Diagrama: *Regular* *inferior* *hipogina* *placentar* *irregular* *tubuloso* *quinquefido* *pubescente* *de* *profloracion* *herbacea*

Corola *gamopetalas* *irregular* *hipogina* *bilabada* *superior* *entero* *el inferior* *dentado*

Androceo - formado de 4 estambres soldados por su base epidi-namos insertados en el tubo de la corola de filamentos cortos anteras biloculares y llegadas a ser uniloculares por avortamiento de uno de los loculos y prolongandose hacia abajo y hacia el interior

Gineceo formado de 2 pistilos soldados estilo largo ensanchado en su extremidad pubescente *hipogina*

(6)

ovarios superos tetriloculares y uniovulados  
ovulo ortotropo y de placentacion axial

Clasificación

Por L. Dibernania angispenna

" D. Hypocrobia

" D. Coraliflora

familia Labradas

Descripcion de un mamifero

Formula dentaria  $\frac{6}{5} \frac{3-3}{3-3} \frac{3}{3}$   $\times \frac{2}{2}$  m.

5 ? incisivos pequeños aviculados caninos

5 largos los de la mandibula inferior mas  
pequeños agudos

molares agudos

Total de dientes 20

Cabeza globulosa: Frente convexa vertex y  
otapisa conchas

conico y agudo con escamas negras y  
por pelo cuello

convexo pecho y vientre convexos cola  
pequeña conca y 2009-2013 de pelo en toda su  
longitud

Miembros mas desarrollados los an-  
teriores que los posteriores siendo los primeros

fuertes ambos terminados por 5 dedos los anteriores  
dirigidos lateralmente y los posteriores hacia adelante

Todos provistos de uñas siendo las de los miembros an-  
teriores mas desarrolladas y teniendo de sus lados

uñas cortantes - Pelaje y coloracion - pelo largo  
abundante y con rabea color gris plomo con ref-  
jos metalicos

Dimensiones Del oido a la extremidad de la  
cola 0.038 cola 0.02 miembros anteriores 0.015 miembros poste-  
res 0.01 apertura comisural 0.028

Clasificación Rama Vertebrados clase ma-  
miferos orden insectivoros familia Talpidae

Descripción de un vegetal.

Raíz (?)

Tallo aseo, ascendente cilíndrico, pubescente surcado y subterráneo.

Hojas completas. C. f.  $\frac{1}{3}$  alternas, simples, peciolo, largo cilíndrico y pubescente; limbo plano, pubescente por ambas caras y palmatinervado y de consistencia herbácea.

Inflorescencia general en racimo, en racimo propiamente dicho.

Flor. hermafrodita, digamia, regular anisostemona, de inserción perigina

Caliz. ~~quinguepartido~~ quinguepartido, regular, ~~carpanulado~~ pubescente, de inserción ~~hipogina~~ de prefloración valvar y ~~marcescente~~.

Corola ~~prolobopetalia~~ quinguepartida, regular, de prefloración ~~borsida~~ borsida y de inserción perigina.

Androceo - ~~indiferentes~~ <sup>en traza</sup> soldados por los <sup>Universidad Autónoma del Estado de México</sup> filamentos y <sup>2009-2013</sup> cubriendo completamente al pistilo +

Gineceo. formado de muchos carpelos soldados en parte por los filetes y libres en la extremidad. Estilo liso y cilíndrico Estigona terminal y bilobada.

+ Anteras, biloculares, extróreas y dobles fijas y de dehiscencia longitudinal

Ovario superior, plurilocular. Ovos anatrofos y de placentación axial.

Grano de embrión deotiledonado

Clasificación

Por A. Monadelfia

Por J. Peripetalia

Por D. C. Poliplores